

















10











許 特 賣 專 佛 米 英 日

# 傳染病

# 惡疫

# 豫防に

# 吸著療法

# アドース錠



## 腸の衛生掃除

### アドース錠 の偉力發揮

アドース錠は吸著効果優秀な植物性炭素に更に特殊の化學的操作を加へて之に活性を附加して一層吸著効果を増強した近代吸著療法剤であります。従つて唯單に有害産物や微菌などを吸著するばかりでなく腸壁に出来た潰瘍面や爛れ粘膜の損傷部までも被ひ補ふて便通を整へるには疲勞倦怠の副作用なく極めて少量で奏効する特徴を以て居るのであります。

アドース錠がどんな學理的根據に基き吸著奏効するかは醫學の權威京都帝國大學醫學部甲田醫學博士に依つて有機色素、毒素、大腸桿菌有毒瓦斯の生物學的實驗を行はれ(實驗醫報第一六四號)學界に發表され又小山博士はデフテリ菌破傷風毒素の吸著實驗を行ひ共に其効果を實證されて居ります。尙又多數の臨床大家に依つて赤痢、疫痢、急性慢性腸カタル、鼓腸、食餌中毒に就て續々實驗報告を寄せられて居ります。以上の成績に依りアドース錠が夏の家庭常備藥として遺憾なく効力を發揮し惡疫を未然に豫防し得るかを首肯せらるゝのであります。

## 驚嘆すべき効果

### この實驗例を見よ

元大阪桃山病院副院長  
關博士 山本利平氏 報告

#### 腸チフス

瀧〇三〇 二十六歳  
發病五日入院。体温三十九度三。脈搏八十五。腹部著しく膨滿。下痢一日三回。黄色泥狀便。アドース錠三個宛。一日三回。持續服用。セシム型。下痢も亦止ム。

#### 赤痢

黒〇明 十五歳  
發病二日入院。便一日二十三回。純結血便。体温三十八度。脈搏九十三。入院時一回下痢ヲ投與シ單ニアドース錠三個宛。一日三回。服用。セシム型。便色漸く呈ス。裏急後重著シク。輕減シ。便ノ回数半減ス。内服四日。便中血液ヲ混ゼズ。粘液モ亦著シク減少。内服一週ニテ粘液ヲ全ク見ズ。局所ノ壓迫並ニ便秘去ル。経過二十三日全治退院ス。

#### 消化不良性下痢

大〇吾 四十四歳  
約二ヶ月間些少不消化物ヲ糞中ニ排出シ。腹中膨滿。食シ難キ。下痢。易ク時々腹痛。共ニ腹鳴アリ。最近下痢數行。裏急後重。惡心。嘔氣。且ツ不快ノ惡臭アル風氣ヲ出ス。アドース五瓦ヲ一日三回分服。數日ニシテ下痢回数半減。第五日以後全ク整腸諸症消散ス。

#### 急性大腸炎

山〇伊 十七歳  
食餌不攝生ニ次イデ裏急後重。腹痛。下痢。アリ。体温三十八度。脈搏九十五。腹部著しく膨滿。下痢一日三回。黄色泥狀便。アドース錠三個宛。一日三回。持續服用。セシム型。下痢も亦止ム。

#### 急性腸カタル

齊〇二〇 十歳  
前日水泳及食事不攝生ヨリ腹痛。下痢。アリ。体温三十八度。脈搏九十五。腹部著しく膨滿。下痢一日三回。黄色泥狀便。アドース錠三個宛。一日三回。持續服用。セシム型。下痢も亦止ム。

## 吸著療法とは

これまでの化學療法や生理作用に影響するような藥劑では効く効かないが、腸内には、毒素や粘液病原菌などの毒物がある。アドース錠は、その毒物を吸著して体外に排泄して仕舞ふ。所謂物理療法を云ふのです。従つて服めば、腸内に毒物が残らず、腸壁も傷みません。大人でも、小兒でも、安心して用ひられ、チフスや結核、血便などで高熱の場合に服んでも何等の副作用もなく奏効します。故に「アドース錠」が各地帝國大學病院、官立、私立、大病院、傳染病院などで吸著療法剤として盛んに採用されてゐるのも宜なる哉であります。

糖衣錠(白錠)	
一五錠入	廿五
五〇錠入	五十
一〇〇錠入	一百
錠劑(黒錠)	
一〇〇錠入	六十
五〇錠入	三十
一〇錠入	六

## 夏の衛生

申込次第無代進呈